

UPDATE 1/2/2018

# Suggesties voor terugbetaalde magistrale bereidingen (1/02/2018)

---



Verantwoordelijke uitgever: Federatie van Brusselse OCMW's

# Overzicht

## ***Suggesties voor terugbetaalde magistrale bereidingen ..... 4***

### **A) DERMATOLOGIE..... 4**

- 1) Behandeling van lichte tot matige acne ..... 4
- 2) Behandeling van rosacea..... 5
- 3) Behandeling van huidmycosen ..... 5
- 4) Bereiding voor lokaal gebruik met een zwak werkzaam corticosteroïde ..... 6
- 5) Bereiding voor lokaal gebruik met een vrij sterk werkzaam corticosteroïde ..... 6
- 6) Bereiding voor lokaal gebruik met een zeer sterk werkzaam corticosteroïde ..... 7
- 7) Behandeling van hyperkeratose van de huid en nagels, behandeling van wratten. .... 7
- 8) Behandeling van ichtyose, hyperkeratose en keratose van de huidfollikels (ontsteking van de follikels) ..... 8
- 9) Behandeling van psoriasis ..... 8
- 10) Behandeling van schurfft ..... 9
- 11) Behandeling van bacteriële en schimmelinfecties van het huidoppervlak ..... 10
- 12) Lokale behandeling van exsudatieve dermatosen met ontsteking: natte kompressen ..... 11
- 13) Lokale behandeling van exsudatieve dermatosen met ontsteking en/of infectie..... 11

### **B) ANDERE ..... 12**

- 1) Oraal antibioticum, zeer actief in de behandeling van acne ..... 12
- 2) Antibiotische therapie voor acute keelpijn bij kinderen ..... 13
- 3) Behandeling met foliumzuur ..... 13

## UPDATE 1/2/2018

- 4) Behandeling van hypocalcemie. Ondersteunend middel bij de preventie en behandeling van osteoporose, toegediend samen met vitamine D ..... 14
- 5) Behandeling van slaapstoornissen van nerveuze oorsprong ..... 15
- 6) Lokale symptomatische behandeling van articulaire aandoeningen of van bepaalde traumata ..... 16
- 7) Behandeling van aambeien ..... 17
- 8) Behandeling van anale kloven..... 17
- 9) Lokale behandeling van buitenoorontsteking met hevige jeuk .. 18

## Suggesties voor terugbetaalde magistrale bereidingen

Een aantal magistrale formules van het TMF<sup>1</sup> hebben onze aandacht getrokken.

Hier volgt een selectie:

### A) DERMATOLOGIE

#### 1) Behandeling van lichte tot matige acne

Rp/ Hydroalcoholische oplossing met 4 % erythromycine TMF

dt 100 g.

S/ Breng een- tot tweemaal per dag aan. Vermijd de omgeving rond de ogen.

#### Bereiding terugbetaald door het RIZIV

##### Samenstelling:

Erythromycine

4,4 g\*

---

<sup>1</sup> TMF: Het Therapeutisch Magistraal Formularium is een officieel referentiewerk met een reeks algemene hoofdstukken en ongeveer tweehonderd magistrale en officinale formules. De beschreven bereidingen werden eerst geselecteerd op basis van de therapeutische aspecten. Ze werden vervolgens gevalideerd in galenisch opzicht (o.a. formulering) en analytisch opzicht (o.a. analysemethode). Om de formules van het TMF te raadplegen: <https://www.tmf-ftm.be>.

## UPDATE 1/2/2018

Watervrij citroenzuur	0,40 g
Ethanol 96 % V/V gedenatureerd	50 g
Gezuiverd water q.s.	ad 100 g

\*Er werd voor erythromycine een overdosering van 10 % voorzien om het verlies door afbraak te compenseren.

### 2) Behandeling van rosacea

Rp/ Hydrofiele gel met 1 % metronidazool TMF  
dt 100 g.

S/ Breng een- tot tweemaal per dag aan. Vermijd de omgeving rond de ogen.

#### **Bereiding terugbetaald door het RIZIV**

→ Vervangt Rozex®, dat niet toegelaten is in de lijst.

### 3) Behandeling van huidmycosen

Rp/ Hydrofiele crème met 2 % miconazoolnitraat TMF  
dt 50 g.

S/ Breng gedurende enkele dagen tot twee weken 's morgens en 's avonds aan op en rond de geïnfecteerde zone.

#### **Bereiding terugbetaald door het RIZIV**

→ Vervangt Daktarin®, dat niet toegelaten is in de lijst.

**4) Bereiding voor lokaal gebruik met een zwak werkzaam corticosteroïde**

Rp/ Hydrofiële crème met 1 % hydrocortisonacetaat TMF  
dt 100 g.

S/ Breng een- tot tweemaal per dag in een dunne laag aan op  
de te behandelen letsels.

**Bereiding terugbetaald door het RIZIV**

**Samenstelling**

Hydrocortisonacetaat	1g
Gebufferde cetomacrogolcrème	ad 100 g

Opm.: De concentratie van 1 % hydrocortisonacetaat in deze bereiding is de maximaal aanbevolen concentratie.

**5) Bereiding voor lokaal gebruik met een vrij sterk werkzaam corticosteroïde**

Rp/ Hydrofobe zalf met 0,05 % clobetasolpropionaat TMF  
dt 100 g.

S/ Breng een- tot tweemaal per dag in een dunne laag aan op  
de te behandelen letsels.

**Bereiding terugbetaald door het RIZIV**

**Samenstelling**

Clobetasonbutyraat	50 mg
Vloeibare paraffine	30 g
Witte vaseline q.s.	ad 100 g

Opm.: De concentratie van 0,05 % clobetasonbutyraat in deze bereiding is de maximaal aanbevolen concentratie.

**6) Bereiding voor lokaal gebruik met een zeer sterk werkzaam corticosteroïde**

- Rp/ Hydroalcoholische oplossing met 0,05 % clobetasolpropionaat  
TMF  
dt 50 g.
- S/ Breng een- tot tweemaal per dag aan op de te behandelen  
letsels.

**Bereiding terugbetaald door het RIZIV**

**Samenstelling**

Clobetasolpropionaat	25 mg
Hydroxypropylcellulose 400*	0,5 g
Isopropylalcohol	35 ml
Gezuiverd water	ad 50 g

Opm.: De concentratie van 0,05 % clobetasolpropionaat in deze bereiding is de maximaal aanbevolen concentratie.

**7) Behandeling van hyperkeratose van de huid en nagels, behandeling van wratten.**

- Rp/ Hydrofobe zalf met 20 %, 30 %, 40 % salicylzuur TMF  
dt 60 g.
- S/ Breng de zalf een- tot tweemaal per dag aan, enkel op de te  
behandelen huidzone. Zorg ervoor dat de omringende huid  
beschermd wordt met zuivere vaseline. Verwijder voorzichtig de  
dode huid vóór elke nieuwe behandeling.

### Bereiding terugbetaald door het RIZIV

#### 8) Behandeling van ichtyose, hyperkeratose en keratose van de huidfollikels (ontsteking van de follikels)

Rp/ Lipofiele crème met 5 % ureum en 5 % natriumchloride TMF  
dt 50 g.

S/ Breng de crème een- tot tweemaal per dag aan, enkel op de te behandelen huidzone.

### Bereiding terugbetaald door het RIZIV

#### Samenstelling

Ureum	2,50 g
Natriumchloride	2,50 g
Waterhoudende vaseline met sorbitansesquioleaat <sup>2</sup> TMF	45 g

#### Opmerkingen

*In concentraties kleiner of groter dan 10 % kan ureum ook aangewend worden omwille van zijn hydraterende en jeukwerende eigenschappen (2 % tot 20 %), omwille van zijn afschilferende werking (20 %) of, onder een occlusief verband, voor het week maken van een aangetaste nagel vooraleer die te verwijderen (30 % tot 50 %).*

#### 9) Behandeling van psoriasis

---

<sup>2</sup> Sorbitansesquioleaat = Arlacel (emulgerend bestanddeel).



## UPDATE 1/2/2018

Rp/ Hydrofobe zalf met 0,10 %, met 0,25 %, met 0,50% of met 1 %  
dithranol TMF  
dt 50 g.

S/ De behandeling wordt gewoonlijk gestart met een hydrofobe zalf met 0,10 % dithranol, waarbij de concentratie tot 1 % verhoogd wordt, naargelang de tolerantie van de patiënt. De behandeling wordt gewoonlijk voortgezet totdat het psoriasisletsel en de omliggende huid een homogene pigmentatie hebben ontwikkeld en het leucomelanoderma geresorbeerd is, d.w.z. doorgaans na 3 tot 5 weken.

### **Bereiding terugbetaald door het RIZIV**

Rp/ Hydrofobe zalf met 20 % ichtammol TMF  
dt 50 g.

S/ Breng de zalf eenmaal per dag in een dunne laag aan op de te behandelen letsels.

### **Bereiding terugbetaald door het RIZIV**

#### **10) Behandeling van schurft**

Rp/ Emulsie met 10 % of 25 % benzylbenzoaat TMF  
dt 200 g.

S/ De patiënt dient zich over het hele lichaam, met uitzondering van het aangezicht, in te wrijven nadat hij een warm bad genomen heeft en zich zorgvuldig met zeep gewassen en geschrobd heeft. De behandeling moet na 2 dagen hernomen worden; slechts dan mag de patiënt zich wassen.

### **Bereiding terugbetaald door het RIZIV**

## UPDATE 1/2/2018

- Rp/ Hydrofiele crème met 5 % permethrine TMF  
dt 100.
- S/ Breng de crème aan op een droge en propere huid.

### **Toedieningswijze**

*Volwassenen en kinderen ouder dan 2 jaar: behandel het hele lichaam, behalve het hoofd. Kinderen tussen 2 maanden en 2 jaar, bejaarden en patiënten met immunodeficiëntie: behandel het hele lichaam, het hoofd inbegrepen, maar vermijd de omgeving rond de mond en de ogen. De behandeling van kinderen jonger dan 6 maanden mag slechts onder medisch toezicht. Gewoonlijk volstaat één behandeling, maar herhaal bij aanhoudende last de behandeling, ten vroegste na één week.*

**Bereiding niet terugbetaald door het RIZIV, maar volledig ten laste genomen door het OCMW, aan het RIZIV-tarief**

➔ Vervangt Zalvor<sup>®</sup>, dat niet toegelaten is in de lijst.

### **11) Behandeling van bacteriële en schimmelinfecties van het huidoppervlak**

- Rp/ Hydrofiele gel met 3 % clioquinol TMF  
dt 50 g.
- S/ Breng twee- tot driemaal per dag in een dunne laag aan op de te behandelen letsels. Reinig de te verzorgen huidzone goed met water en zeep, en droog af vooraleer de gel aan te brengen.

**Bereiding terugbetaald door het RIZIV**

U kunt de lijst ook raadplegen op [www.geneesmiddelen.brussels](http://www.geneesmiddelen.brussels).  
Alleen de lijst op de website heeft kracht van wet.

### Samenstelling

Clioquinol	1,50 g
Dinatriumedetaat	50 mg
Carbomeergel TMF	48,45 g

#### 12) Lokale behandeling van exsudatieve dermatosen met ontsteking: natte kompressen

Rp/ Burowoplossing PB V 6 g  
Gezuiverd water q.s. ad 300 ml

S/ Breng aan met natte kompressen, viermaal per dag.

### Bereiding terugbetaald door het RIZIV

#### **Toedieningswijze**

*Drenk een kompres in verdunde Burowoplossing, leg dit kompres op het letsel en bevestig het met een niet-occlusief verband. Dit kompres moet vochtig blijven; het moet opnieuw worden bevochtigd of worden vervangen door een nieuw kompres voordat het droog is.*

*De oplossing moet kunnen verdampen, want het is de verdamping op het huidoppervlak die een koelend, anti-jeuk- en drogend effect heeft. Gebruik geen occlusief verband.*

#### 13) Lokale behandeling van exsudatieve dermatosen met ontsteking en/of infectie

UPDATE 1/2/2018

Rp/ Dalibourwater 120 g  
Gezuiverd water q.s. ad 300 ml

S/ Breng aan met natte kompressen, viermaal per dag.

### **Bereiding terugbetaald door het RIZIV**

#### **Toedieningswijze**

*Drenk een kompres in verdund Dalibourwater, leg dit kompres op het letsel en bevestig het met een niet-occlusief verband. Dit kompres moet vochtig blijven; het moet opnieuw worden bevochtigd of worden vervangen door een nieuw kompres voordat het droog is. De oplossing moet kunnen verdampen, want het is de verdamping op het huidoppervlak die een koelend, anti-jeuk- en drogend effect heeft. Omhul het kompres niet met een occlusief verband.*

## **B) ANDERE**

### **1) Oraal antibioticum, zeer actief in de behandeling van acne**

Rp/ Gelules met 50 mg of 100 mg\* minocycline FTM  
voor een gelule  
dt x gelules

S/ 100 mg per dag tijdens de acute fase, daarna 50 mg per dag als onderhoudsdosis.

\*50 mg basiminocycline = 58 mg minocyclinehydrochloride dihydraat.

### **Bereiding terugbetaald door het RIZIV**

**Opelet:** maximale terugbetaalde hoeveelheid: 20 gelules per voorschrift

U kunt de lijst ook raadplegen op [www.geneesmiddelenbrussels.be](http://www.geneesmiddelenbrussels.be).  
Alleen de lijst op de website heeft kracht van wet.

## 2) Antibiotische therapie voor acute keelpijn bij kinderen

- Rp/ Suikervrije siroop voor kinderen met 32,5 mg of 50.000 I.E. kaliumfenoxymethylpenicilline/ml TMF  
dt 100 ml
- S/ 50.000 I.E. (1,0 ml of 32,5 mg) per kilogram  
lichaamsgewicht per dag, gespreid over 3 tot 4 innamen.

### Bereiding terugbetaald door het RIZIV

#### Samenstelling

Kaliumfenoxymethylpenicilline	5,000.000 I.E.
Bananenaroma	100 mg
Natriumsacharinaat	10 mg
Water voor bewaring	50 ml
Vloeibaar sorbitol 70% niet-kristalliseerbaar	ad 100ml

#### Opmerkingen

Synoniem van kaliumfenoxymethylpenicilline = kalium-V-penicilline

## 3) Behandeling met foliumzuur

### Bereiding terugbetaald door het RIZIV

- Rp/ Gelules met 0,4 mg of 4 mg foliumzuur TMF  
dt 60 gelules
- S/ Het geneesmiddel wordt ingenomen tijdens een maaltijd

#### POSOLOGIE:

- Megaloblastische, macrocytaire en hemolytische anemie:

## UPDATE 1/2/2018

Volwassenen: 4 mg per dag gedurende 4 maanden of tot herstel van de hematopoëse; 12 mg per dag kan noodzakelijk zijn in geval van malabsorptie. Verzeker daarna een voldoende dagelijkse toediening: 0,2 of 0,4 mg. Een continue behandeling met 4 mg, met een tussentijd van 1 tot 7 dagen kan noodzakelijk zijn in geval van chronische hemolytische anemie en bij dialysepatiënten.

- Preventie van neuraalbuisdefecten:
  - Primaire preventie: 0,4 mg per dag vanaf 8 weken vóór de conceptie tot en met de tweede maand van de zwangerschap.
  - Secundaire preventie: Bij vrouwen die vroeger een kind ter wereld gebracht hebben met een afwijking van de neuraalbuis zal, gedurende de periode die de conceptie voorafgaat, 4 mg per dag toegediend worden.
  - Bij vrouwen die fenytoïne of fenobarbital nemen: 4 mg per dag, gedurende de periode die de conceptie voorafgaat.

Behandeling van foliumzuurdeficiëntie: 0,4 tot 2 mg per dag.

Bij gebruik van anti-epileptica (fenytoïne en fenobarbital): 4 mg per dag.

**4) Behandeling van hypocalcemie. Ondersteunend middel bij de preventie en behandeling van osteoporose, toegediend samen met vitamine D**

Rp/      Gelules met 1,25 g calciumcarbonaat\* TMF

U kunt de lijst ook raadplegen op [www.geneesmiddelenbrussels.be](http://www.geneesmiddelenbrussels.be).  
Alleen de lijst op de website heeft kracht van wet.

UPDATE 1/2/2018

dt x gelules (maximaal 60)

\* wat overeenstemt met 500 mg elementair calcium

### Bereiding terugbetaald door het RIZIV

Dosering voor volwassenen:

- a) **Preventie van osteoporose:** 0,5 tot 1,0 g elementair calcium (of 1,25 tot 2,5 g calciumcarbonaat) per dag, om te komen tot een totale inname (dieet en supplementen) van 1,5 g elementair calcium per dag, samen met vitamine D (800 I.E. per dag).
- b) **Preventie van hypocalcemie:** 1,0 g elementair calcium (of 2,5 g calciumcarbonaat) per dag.
- c) **Calciumdepletie:** 1,0 tot 2,0 g elementair calcium (of 2,5 tot 5,0 g calciumcarbonaat), zelfs meer per dag.

### 5) Behandeling van slaapstoornissen van nerveuze oorsprong

Rp/ Kalmerende druppels met tincturen van meidoorn en passiebloem  
TMF  
dt 30g

S/ 50 druppels, driemaal per dag

### Bereiding terugbetaald door het RIZIV

#### Samenstelling

Meidoorntinctuur	15,0 g
Passiebloemkruidtinctuur	15,0 g

15

U kunt de lijst ook raadplegen op [www.geneesmiddellend.brussels](http://www.geneesmiddellend.brussels).  
Alleen de lijst op de website heeft kracht van wet.

## UPDATE 1/2/2018

- Rp/ Kalmerende gelules met extracten van meidoorn, passiebloem  
en valeriaan TMF  
voor een gelule  
dt 20 gelules
- S/ Hartstoornissen: 1 gelule, driemaal per dag  
Lichte slapeloosheid: 1 of 2 gelule(s) 's avonds

### Bereiding terugbetaald door het RIZIV

#### Samenstelling

Droog extract van meidoornblad en -bloem	100 mg
Droog passiebloemextract	100 mg
Droog hydroalcoholisch valeriaanextract	100 mg
Verdunningsmiddel A q.s.	voor 1 gelule

### 6) Lokale symptomatische behandeling van articulaire aandoeningen of van bepaalde traumata

- Rp/ Gel met 3 % flufenaminezuur TMF  
dt 100 g
- S/ Breng, tweemaal per dag, 4 tot 5 cm uitgeknepen gel aan op de pijnlijke plaats; spreid uit met de vingers en masseer lichtjes om te laten indringen.

### Bereiding terugbetaald door het RIZIV

#### Samenstelling

Flufenaminezuur	3 g
Watervrij carbomeergel	ad 100g

U kunt de lijst ook raadplegen op [www.geneesmiddelenbrussels.be](http://www.geneesmiddelenbrussels.be).  
Alleen de lijst op de website heeft kracht van wet.



## 7) Behandeling van aambeien

Rp/ Collargol zetpillen\* **met** 150mg FTM  
dt x zetpillen (max 20).

S/ 1 zetpil, 's avonds, vóór het slapengaan.

\*Collargol is een combinatie van colloïdaal metaalzilver en eiwitten. Het bezit antibacteriële eigenschappen door het vrijkomen van kleine hoeveelheden geïoniseerd zilver.

### **Bereiding terugbetaald door het RIZIV**

Rp/ Lipofiele crème met 0,5 % hydrocortisonacetaat en 2 %  
lidocaïnehydrochloride TMF  
dt x g

S/ Reinig zorgvuldig de anale zone en breng de crème 's morgens en 's  
avonds aan. De behandelingstermijn mag niet meer bedragen dan  
2 weken, daar bij langdurig gebruik van de bereiding een atrofie  
van de huid en de mucosa kan optreden, als gevolg van de  
aanwezigheid van het corticosteroïde.

### **Bereiding terugbetaald door het RIZIV**

## 8) Behandeling van anale kloven

Rp/ Hydrofobe zalf met 1 % isosorbidedinitraat TMF dt 50 g

S/ Breng, met behulp van wegwerphandschoenen, ongeveer 1  
g zalf (wat overeenkomt met ongeveer 1,5 cm, gemeten bij  
de uitgang van de tube) aan rond de anus, telkens met een  
tussentijd van 3 uur.

**Bereiding niet terugbetaald door het RIZIV, maar volledig ten laste genomen door het OCMW, aan het RIZIV-tarief.**

**9) Lokale behandeling van buitenoorontsteking met hevige jeuk**

Rp/ Zure oplossing voor het oor met 1 % hydrocortison TMF  
dt 10 g

S/ 3 tot 4 druppels, drie- tot viermaal per dag, in het vooraf  
gereinigd en gedroogd oor.

**Bereiding terugbetaald door het RIZIV**

**Samenstelling**

Azijnzuur 30%	0,72 g
Hydrocortison (gemicroniseerd)	0,30 g
Propyleenglycol q.s.	ad 30 g

**Opgelet:** Propyleenglycol is ototoxisch en absoluut tegenaangewezen wanneer het trommelvlies geperforeerd is.